<p>Nachweis von Wasserstoff (Knallgasprobe)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ein Gemisch aus Wasserstoff und Luft / Sauerstoff explodiert beim Hinzutreten eines Zündfunken mit einem lauten Knall. - Reaktionsgleichung: $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$
<p>Nachweis von Kohlenstoffdioxid (Kalkwasserprobe)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Trübung von Kalkwasser beim Einleiten von Kohlenstoffdioxid - Die Trübung beruht auf der Bildung eines milchig weißen Niederschlags von Calciumcarbonat (= Kalk): $\text{Ca(OH)}_2 + \text{CO}_2 \rightarrow \text{CaCO}_3\downarrow + \text{H}_2\text{O}$ <p style="text-align: center;">Kalkwasser Kohlenstoffdioxid Kalk Wasser</p>
<p>exotherme Reaktion</p>	<p>Wärmeenergie wird bei der Reaktion frei.</p> <p>(exoenergetische Reaktionen: $\Delta E_R < 0$)</p> <p>(ΔE_A bzw. $\Delta E^\#$ = Aktivierungsenergie)</p>
<p>endotherme Reaktion</p>	<p>Wärmeenergie wird bei der Reaktion aufgenommen bzw. ständige Wärmezufuhr ist nötig.</p> <p>(endoenergetische Reaktionen: $\Delta E_R > 0$)</p>
<p>Katalysatoren</p>	<ul style="list-style-type: none"> - setzen die Aktivierungsenergie bei einer chemischen Reaktion herab. - gehen aus der Reaktion unverändert hervor (werden hierbei nicht verbraucht). - erhöhen die Reaktionsgeschwindigkeit einer chemischen Reaktion. - Beispiel: Platin katalysiert die Knallgasreaktion $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \xrightarrow{[\text{Pt}]} 2\text{H}_2\text{O}$
<p>Orbital (= Elektronenwolke)</p>	<p>Bereich um einen Atomkern, in dem sich ein Elektron (oder ein Elektronenpaar) mit einer hohen Wahrscheinlichkeit aufhält</p>
<p>Elektronenpaar-abstoßungsmodell (= EPA-Modell)</p>	<p>Modell zur Herleitung des räumlichen Baus von Molekülen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aufstellen der Valenzstrichformel des Moleküls. 2. Die Elektronenpaare stoßen sich gegenseitig ab und ordnen sich mit größtmöglichem Abstand um das Zentralatom an. 3. Mehrfachbindungen (Doppel- und Dreifachbindungen) werden im EPA-Modell näherungsweise als Einfachbindungen (einzelne Elektronenwolke) betrachtet. 4. Bindungswinkel bei <ul style="list-style-type: none"> 2 Elektronenwolken um ein Atom: 180° (lineare Anordnung) 3 Elektronenwolken um ein Atom: 120° (trigonal planare Anordnung) 4 Elektronenwolken um ein Atom: 109,5° (tetraedrische Anordnung)
<p>Polare Atombindung</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Eine polare Atombindung (Bindungspolarität) liegt vor, wenn sich die beiden an der Atombindung beteiligten Atome in ihrer Elektronegativität (EN) unterscheiden: <ul style="list-style-type: none"> • Das Atom mit der größeren Elektronegativität zieht das Elektronenpaar stärker zu sich heran und ist negativ polarisiert (negative Partialladung, δ^-). • Das andere Atom mit der niedrigeren Elektronegativität ist positiv polarisiert (positive Partialladung, δ^+). <p style="text-align: center;">$\delta^+ \quad \delta^-$</p> <p style="text-align: center;">Beispiel: H — Cl</p> - Je größer der Elektronegativitätsunterschied zwischen zwei miteinander über eine Elektronenpaarbindung verbundenen Atomen ist, desto größer ist die Bindungspolarität. - Sind zwei gleiche Atome miteinander verbunden, so ist keine Bindungspolarität vorhanden (unpolare Atombindung). Beispiel: H-H, F-F, Cl-Cl etc.

Redoxreaktionen	<ul style="list-style-type: none"> - Elektronenübertragungs- / Elektronenaustauschreaktionen - Kombination von Reduktionsreaktion und Oxidationsreaktion
<i>Oxidation</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Teilreaktion, bei der eine Elektronenabgabe stattfindet - Beispiel: Ox.: $\text{Na} \rightarrow \text{Na}^+ + \text{e}^-$
<i>Reduktion</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Teilreaktion, bei der eine Elektronenaufnahme stattfindet - Beispiel: Red.: $\text{Cl}_2 + 2\text{e}^- \rightarrow 2\text{Cl}^-$
<i>Oxidationsmittel</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Sie oxidieren andere Stoffe und werden selbst reduziert. - Sie nehmen Elektronen auf (Elektronenakzeptoren). - Typische Oxidationsmittel: <ul style="list-style-type: none"> • Sauerstoff (O_2) und Halogene (F_2, Cl_2, Br_2, I_2) • Dichromat-Ionen ($\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$) und Permanganat-Ionen (MnO_4^-)
<i>Reduktionsmittel</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Sie reduzieren andere Stoffe und werden selber oxidiert. - Sie geben Elektronen ab (Elektronendonatoren). - Typische Reduktionsmittel: <ul style="list-style-type: none"> • Wasserstoff (H_2), Metalle (Na, Mg, Al), Kohlenstoff (C) • Sulfid-Ionen (S^{2-})
<i>Oxidationszahl (OZ)</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Die Anzahl wirklicher bzw. angenommener („gedachte“ / ermittelte) Ladungen von Atomen wird als OZ bezeichnet. Sie ist ein Hilfsmittel zur Ermittlung der Anzahl der ausgetauschten Elektronen bei Redox-Reaktionen. - Bei einer Redoxreaktion verändert sich die OZ: <ul style="list-style-type: none"> • Erhöhung der OZ $\Rightarrow$ Oxidation • Erniedrigung der OZ $\Rightarrow$ Reduktion
<i>Ermittlung der OZ</i> (Methode der Bezugselemente)	<ul style="list-style-type: none"> - Atome in <u>Elementen</u> haben stets die OZ null. Beispiele: H_2, Cl_2, O_2, Mg, Na, Al etc. - Fluoratome in <u>Verbindungen</u> haben stets die OZ -1. Beispiele: HF, NaF etc. - Wasserstoffatome in <u>Verbindungen</u> haben in der Regel die OZ +1. Beispiele: HCl, H_2O etc. Ausnahme: Hydride (NaH) $\text{OZ}(\text{H}) = -1$ - Sauerstoffatome in <u>Verbindungen</u> haben in der Regel die OZ -2. Beispiele: CaO, H_2O Ausnahme: Peroxide (H_2O_2) $\text{OZ}(\text{O}) = -1$ - Bei <u>Atom-Ionen</u> ist die OZ gleich der Ionenladung. Beispiele: Fe^{3+} $\text{OZ}(\text{Fe}^{3+}) = +3$ - Bei <u>Molekül-Ionen</u> ist die Summe der OZen der Atome gleich der Ionenladung. Beispiel: MnO_4^- $\text{OZ}(\text{O}) = -2$, $\text{OZ}(\text{Mn}) = +7$ - Bei <u>ungeladenen Molekülen und Salzen</u> ist die Summe der OZen der Atome null. Beispiele: MnO_2 $\text{OZ}(\text{O}) = -2$, $\text{OZ}(\text{Mn}) = +4$
<i>Regeln zum Aufstellen von Redox-Reaktionen</i>	<p>Beispiel: Kaliumpermanganat reagiert im Sauren mit Kaliumiodid unter Bildung von Mangan(II)-Ionen und Iod.</p> <ol style="list-style-type: none"> <u>Anschreiben der Redoxpaare (oxidierte und reduzierte Teilchen):</u> $\text{MnO}_4^- / \text{Mn}^{2+}$ I^- / I_2 (saurer Milieu) <u>Ermittlung der OZ:</u> $\text{OZ}(\text{Mn}) = +7 / \text{OZ}(\text{Mn}) = +2$ $\text{OZ}(\text{I}^-) = -1 / \text{OZ}(\text{I}) = 0$ <u>Ausgleichen der Anzahl der Atome, deren OZ sich verändert:</u> $\text{MnO}_4^- / \text{Mn}^{2+}$ (bereits ausgegl.) $2\text{I}^- / \text{I}_2$ <u>Anschreiben der ausgetauschten Elektronen mithilfe der OZ:</u> Red.: $\text{MnO}_4^- + 5\text{e}^- \rightarrow \text{Mn}^{2+}$ Ox.: $2\text{I}^- \rightarrow \text{I}_2 + 2\text{e}^-$ <u>Ladungsausgleich mit H_3O^+-Ionen im Sauren / OH^--Ionen im Bas.:</u> Red.: $\text{MnO}_4^- + 5\text{e}^- + 8\text{H}_3\text{O}^+ \rightarrow \text{Mn}^{2+}$ Ox.: $2\text{I}^- \rightarrow \text{I}_2 + 2\text{e}^-$ (bereits ausgeglichen) <u>Ausgleichen der Stoffbilanz mit Wassermolekülen:</u> Red.: $\text{MnO}_4^- + 5\text{e}^- + 8\text{H}_3\text{O}^+ \rightarrow \text{Mn}^{2+} + 12\text{H}_2\text{O}$ /•2 Ox.: $2\text{I}^- \rightarrow \text{I}_2 + 2\text{e}^-$ (bereits ausgegl.) /•5 <u>Ermittlung der Redoxreaktion aus den Teilgleichungen:</u> Redox: $2\text{MnO}_4^- + 16\text{H}_3\text{O}^+ + 10\text{I}^- \rightarrow 2\text{Mn}^{2+} + 24\text{H}_2\text{O} + 5\text{I}_2$

Nomenklatur der Kohlenwasserstoffe	Vorsilben für die ersten 10 Glieder der homologen Reihe (C ₁ bis C ₁₀): Meth-, Eth-, Prop-, But-, Pent-, Hex-, Hept-, Oct-, Non-, Dec-												
Alkane	<p>1. Geradkettige Alkane Geradkettige Alkane werden als n-Alkane (= Normalalkane) bezeichnet. Bsp.: $\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{-CH}_3$ <i>n-Heptan</i></p> <p>2. Verzweigt-kettige Alkane</p> <p>a. Die <u>längste Kohlenstoffkette</u> im Molekül bestimmt das Namensende des Alkans (= <i>Stammname</i>). Bsp.: $\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-CH(CH}_3\text{)-CH}_3$ <i>...-butan</i></p> <p>b. Durchnummerieren der längsten Kohlenstoffkette (= <i>Hauptkette</i>), sodass <u>Verzweigungen</u> (= <i>Seitenketten</i>) eine <u>möglichst niedrige Nummer</u> erhalten. Bsp.: $\text{}^4\text{CH}_3\text{-}^3\text{CH}_2\text{-}^2\text{CH(CH}_3\text{)-}^1\text{CH}_3$</p> <p>c. Der Name der <u>Seitenkette</u> wird entsprechend der Zahl ihrer Kohlenstoff-atome gebildet. Dabei wird die <u>Endung</u> -an durch <u>-yl</u> ersetzt. Bsp.: -CH_3 <i>...-methyl</i> $\text{-C}_5\text{H}_{11}$ <i>...-pentyl</i></p> <p>d. Die <u>Stellung der Seitenkette</u> wird durch die <u>Nummer des sie tragenden C-Atoms</u> der Hauptkette (= <i>Verknüpfungsziffer</i>) gekennzeichnet. Bsp.: $\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-CH(CH}_3\text{)-CH}_3$ <i>2-Methylbutan</i></p> <p>e. Ist eine Seitenkette mehr als einmal vorhanden, so wird ihre <u>Anzahl durch griech. Zahlenwörter</u> angegeben (di: 2, tri: 3, tetra: 4, penta: 5, hexa: 6 etc.). Bsp.: $\text{CH}_3\text{-CH(CH}_3\text{)-CH(CH}_3\text{)-CH}_3$ <i>2,3-Dimethylbutan</i></p> <p>f. Sind <u>unterschiedliche Seitenketten</u> vorhanden, so werden diese in <u>alphabetischer Reihenfolge</u> genannt. Griech. Zahlenwörter werden dabei <u>nicht</u> berücksichtigt. Bsp.: $\text{CH}_3\text{-CH(CH}_3\text{)-CH(C}_2\text{H}_5\text{)-CH}_2\text{-CH}_2\text{-CH}_3$ <i>3-Ethyl-2-methylhexan</i></p>												
Alkene	<p>1. Endsilbe: -en, -dien, -trien</p> <table border="1" data-bbox="486 1209 1476 1288"> <tr> <td>$\text{H}_2\text{C=CH-CH}_3$</td> <td><i>Propen</i></td> </tr> <tr> <td>$\text{H}_2\text{C=C=CH}_2$</td> <td><i>Propadien</i></td> </tr> </table> <p>2. Die Lage der Doppelbindung wird durch die Nummer des C-Atoms gekennzeichnet, das die kleinste Nummer trägt.</p> <table border="1" data-bbox="486 1366 1476 1411"> <tr> <td>$\text{H}_3\text{C-CH}_2\text{-CH}_2\text{-CH=CH}_2$</td> <td><i>Pent-1-en</i></td> </tr> </table> <p>3. Verzweigt-kettige Alkene</p> <p>a. Der Stammname des Alkens ist die <u>längste Kette</u>, die die Doppelb. enthält.</p> <table border="1" data-bbox="486 1512 1476 1590"> <tr> <td>$\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-C(CH}_3\text{)=CH}_2$</td> <td><i>2-Methylbut-1-en</i></td> </tr> </table> <p>b. Die Kette wird so durchnummeriert, dass die Doppelbindung die niedrigste Nummer erhält (und nicht die erste Seitenkette):</p> <table border="1" data-bbox="486 1668 1476 1747"> <tr> <td>$\text{CH}_3\text{-CH(CH}_3\text{)-CH=CH}_2$</td> <td><i>3-Methylbut-1-en</i></td> </tr> </table> <p>4. Bei Alkenen mit symmetrischem Stammsystem erhält die Seitenkette die niedrigere Nummer.</p> <table border="1" data-bbox="486 1825 1476 1904"> <tr> <td>$\text{H}_3\text{C-CH}_2\text{-CH=CH-CH(CH}_3\text{)-CH}_3$</td> <td><i>2-Methylhex-3-en</i></td> </tr> </table>	$\text{H}_2\text{C=CH-CH}_3$	<i>Propen</i>	$\text{H}_2\text{C=C=CH}_2$	<i>Propadien</i>	$\text{H}_3\text{C-CH}_2\text{-CH}_2\text{-CH=CH}_2$	<i>Pent-1-en</i>	$\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-C(CH}_3\text{)=CH}_2$	<i>2-Methylbut-1-en</i>	$\text{CH}_3\text{-CH(CH}_3\text{)-CH=CH}_2$	<i>3-Methylbut-1-en</i>	$\text{H}_3\text{C-CH}_2\text{-CH=CH-CH(CH}_3\text{)-CH}_3$	<i>2-Methylhex-3-en</i>
$\text{H}_2\text{C=CH-CH}_3$	<i>Propen</i>												
$\text{H}_2\text{C=C=CH}_2$	<i>Propadien</i>												
$\text{H}_3\text{C-CH}_2\text{-CH}_2\text{-CH=CH}_2$	<i>Pent-1-en</i>												
$\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-C(CH}_3\text{)=CH}_2$	<i>2-Methylbut-1-en</i>												
$\text{CH}_3\text{-CH(CH}_3\text{)-CH=CH}_2$	<i>3-Methylbut-1-en</i>												
$\text{H}_3\text{C-CH}_2\text{-CH=CH-CH(CH}_3\text{)-CH}_3$	<i>2-Methylhex-3-en</i>												
Alkine	<p>- Nomenklatur analog der Nomenklatur der Alkene (s.o.): Beispiel: $\text{H}_3\text{C-C}\equiv\text{C-CH(CH}_3\text{)-CH}_3$ <i>4-Methylpent-2-in</i></p>												

<p>Vergleich der Halogenierung von Alkanen und Alkenen</p>	<p>A Halogenierung von Alkanen: Beispiel: Chlorierung von Methan $\text{CH}_4 + \text{Cl}_2 \rightarrow \text{H}_3\text{C-Cl} + \text{HCl}\uparrow$ Substitutionsreaktion: Ein H-Atom wird durch ein Halogenatom ersetzt (Mech.: radikalische Substitution)</p>	<p>B Halogenierung von Alkenen: Beispiel: Bromierung von Ethen $\text{H}_2\text{C=CH}_2 + \text{Br}_2 \rightarrow \text{BrH}_2\text{C-CH}_2\text{Br}$ Additionsreaktion: Die Bromatome werden an die Doppelbindung addiert (Mech.: elektrophile Addition)</p>	
<p>Isomerie</p>	<p>Phänomen, dass mehrere Verbindungen trotz gleicher Summenformel einen unterschiedlichen Molekülbau und infolgedessen unterschiedliche (physikalische und chemische) Eigenschaften aufweisen</p>		
<p><i>Konstitutionsisomerie</i></p>	<p>- Typ von Isomerie, bei der die Atome im Molekül unterschiedlich miteinander verknüpft sind. - Beispiel: $\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{-CH}_3$ <i>n-Butan</i> $\begin{matrix} \text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_3\text{-CH-CH}_3 \end{matrix}$ <i>2-Methylpropan</i></p>		
<p><i>Stereoisomerie</i></p>	<p>- Typ von Isomerie, bei der die Atome trotz gleicher Verknüpfung zueinander räumlich unterschiedlich angeordnet sind. - Beispiel: <i>E-Z-Isomerie</i> Typ der <u>Stereoisomerie</u>, bei der die unterschiedliche räuml. Anordnung der Atome auf der gehinderten Rotation um eine C-C-Doppelbindung beruht:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>Z- bzw. cis-1,2-Dichlorethen</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>E- bzw. trans-1,2-Dichlorethen</p> </div> </div>		
<p>Alkohole</p>	<p>Organische Moleküle mit mindestens einer Hydroxy(l)-Gruppe (-OH)</p>		
	<p>Primäre Alkohole OH-Gruppe tragendes C-Atom endständig</p>	<p>Sekundäre Alkohole OH-Gruppe tragendes C-Atom mit 2 weiteren C-Atomen verbunden</p>	<p>Tertiäre Alkohole OH-Gruppe tragendes C-Atom mit 3 weiteren C-Atomen verbunden</p>
<p>Carbonylverbindungen</p>		<p>- Sie enthalten eine Carbonylgruppe (C=O) im Molekül. - Ketone: R und R' sind Kohlenwasserstoff-Reste, Beispiel: Propanon = $\text{H}_3\text{C-CO-CH}_3$ - Aldehyde: R' ist ein H-Atom (Methanal: R <u>und</u> R' H-Atome) Beispiele: Ethanal = $\text{H}_3\text{C-CHO}$, Methanal = H-CHO - Das C-Atom der Carbonylgruppe ist positiv polarisiert.</p>	
<p>Carbonsäuren</p>	<p>- Organische Moleküle mit mindestens einer Carboxy(l)-Gruppe (-COOH). - Carbonsäuren reagieren sauer:</p> <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> </div> <p style="text-align: center;">Carbonsäure Carboxylat-Anion</p>		
<p>Ester</p>	<p>- Ester entstehen bei der Reaktion einer Carbonsäure mit einem Alkohol.</p> <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> </div> <p style="text-align: center;">Carbonsäure Carbonsäureester</p> <p>- Ester können umgekehrt mit Wasser wieder zu den Ausgangsstoffen reagieren (Esterhydrolyse). => Es stellt sich ein Ester-Gleichgewicht, bei dem Esterbildung und Esterhydrolyse in gleichem Maße ablaufen.</p>		
<p>Peptidbindung</p>	<p>Entsteht durch Wasserabspaltung (Kondensation) zw. der Carboxy-Gruppe einer Aminosäure und der α-Aminogruppe einer anderen Aminosäure:</p> <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> </div> <p style="text-align: center;">Aminosäure 1 Aminosäure 2 Dipeptid Wasser</p> <p>Durch fortgesetzte Kondensation bilden sich Polypeptide bzw. Proteine (= Eiweißstoffe).</p>		